



Kindertagesstätte „Wirbelwind“
 Markenzeichen Bewegungskindergarten
 31603 Diepenau; Am Sportplatz 5
 Tel.: 05775/4 88



Infektionsschutzgesetz

Wiederzulassung für Kindertagesstätten

(Orientiert an der Empfehlung vom Robert-Koch-Institut)

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung
Durchfall & Erbrechen	1-10 Tage	48 Stunden nach Abklingen der Symptome
Keuchhusten	6-20 Tage	Nach Antibiotikagabe, frühestens nach 5 Tagen
Masern	7-21 Tage	Nach Abklingen der Symptome, frühestens nach 5 Tagen
Mumps	12-25 Tage	Nach Abheilung, frühestens nach 5 Tagen
Röteln	14-21 Tage	8 Tage nach Exanthembeginn
Windpocken	8-28 Tage	1 Wochen nach Exanthembeginn
Krätze	2-6 Wochen	Nach abgeschlossener Behandlung
Scharlach	1-3 Tage	24 Stunden nach Beginn einer Antibiotikatherapie und Abklingen der Symptome, sonst nach Genesung
Kopfläuse		Mit schriftlicher Bescheinigung der Eltern oder eines Arztes, dass eine Behandlung ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Bei wiederholtem Befall: Ärztliches Attest
Ansteckende Bindehautentzündung	5-12 Tage	Nach ärztlichem Urteil
Fieber		24 Stunden fieberfrei; ohne Medikamentengabe

Stand 04/2024

Hand-Mund-Fuß-Krankheit	3-10 Tage	Nach Genesung
Influenza („Grippe“)	1-2 Tage	Nach Genesung
Ringelröteln	7-14 Tage	Nach Beginn des Ausschlags
Pfeiffersches Drüsenfieber	7-30 Tage	Nach Genesung
Herpes		Nach Abheilung des Ausschlages

Diverse andere Krankheiten: Nach Rücksprache mit den Fachkräften.

Meldepflicht gemäß § 34 Infektionsschutzgesetz (Dies übernimmt der Kindergarten oder der Arzt)

Bitte informieren Sie die Kita frühzeitig über die Erkrankung Ihres Kindes. Wir unterliegen der Schweigepflicht, möchten jedoch durch einen Aushang andere Kinder und Eltern (besonders Schwangere) schützen.

Das Verabreichen von Medikamenten wird in der Einrichtung nicht übernommen.

Wir behalten uns das Hausrecht vor, bei Verdacht oder wenn die Kinder kränklich in die Einrichtung kommen, diese abholen zu lassen.

Wir behalten uns vor im Einzelfall ein Attest einzufordern.

Es ist nicht notwendig, ein Attest vom Kinderarzt ausstellen zu lassen. Sie können auch einen Allgemeinmediziner aufsuchen.